



TREVICTA® PLAN



**CODZIENNIE
LEKI DOUSTNE**
rysperydon, paliperidon

INICJOWANIE leku XEPLION®

po doustnym rysperydonie^{1,2}



RAZ W MIESIĄCU
XEPLION®
palmitynian paliperidonu

DAWKOWANIE leku XEPLION®

PIERWSZA DAWKA POCZĄTKOWA

Dzień 1
150 mg
do mięśnia
naramiennego



DRUGA DAWKA POCZĄTKOWA

Dzień 8
100 mg
do mięśnia
naramiennego



DAWKA PODTRZYMUJĄCA

**1 miesiąc po drugiej
dawce początkowej**
75 mg - zalecana dawka
do mięśnia naramiennego/pośladkowego
zakres dawek: 25 – 150 mg*

1 miesiąc później
75 mg - zalecana dawka
do mięśnia naramiennego/pośladkowego
zakres dawek: 25 – 150 mg*

itd.

† Dawki doustnego rysperydonu i leku Xeplion® potrzebne do osiągnięcia podobnej ekspozycji w stanie stacjonarnym na paliperidon podczas leczenia podtrzymującego po dawkach początkowych w dniach 1. i 8.


* U niektórych pacjentów korzystne może być stosowanie mniejszej lub większej dawki, zależnie od indywidualnej tolerancji leku i (lub) skuteczności.
Dostępne w Polsce dawki leku Xeplion®: 75 mg, 100 mg, 150 mg

RAZ NA 3 MIESIĄCE
TREVICTA®
palmitynian paliperidonu



INICJOWANIE leku TREVICTA®

u pacjentów ustabilizowanych klinicznie na preparacie XEPLION® i nie wymagających dostosowania dawki³



Preferowany okres wcześniejszego leczenia lekiem Xeplion® to co najmniej cztery miesiące

Janssen Neuroscience

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF **Johnson & Johnson**

Referencje:

1. Russu A et al. Int J Clin Pract 2018; 72(6): e13089 [Epub ahead of print]
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Xeplion® z dnia 09.04.2021
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Trevicta® z dnia 09.04.2021

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Ilżęcka 24, 02-135 Warszawa
tel. +48 22 237 60 00, fax +48 22 237 60 31, www.janssen.com/poland

